

▼ Enjaymo

(sutimlimab)

Pasientveiledning

Viktig sikkerhetsinformasjon

Denne veiledningen gir deg informasjon om:

- Hva **ENJAYMO** (sutimlimab) er
- Risikoen for alvorlige infeksjoner og meningokokkinfeksjoner
- Vaksinasjonsanbefalinger
- Symptomer på infeksjoner som du skal være oppmerksom på under behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab)

▼ Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Du kan bidra ved å melde enhver mistenkt bivirkning, se www.dmp.no/pasientmelding

Hva du må vite om **ENJAYMO** (sutimlimab)

Hva er **ENJAYMO** (sutimlimab)?^{1,2}

ENJAYMO (sutimlimab) er et reseptpliktig legemiddel som brukes til å behandle nedbrytning av de røde blodcellene (hemolytisk anemi) hos voksne pasienter med kuldeagglutinin sykdom (CAD-cold agglutinin disease). Det reduserer anemi og utmattelse (fatigue).

Hva er CAD?^{1, 2}

CAD er en sjelden blodsykdom som gjør at visse antistoffer i immunsystemet binder seg til røde blodceller. Dette forårsaker nedbrytning av de røde blodcellene (hemolytisk anemi).

Risiko for infeksjon ved behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab)^{1, 2}

ENJAYMO (sutimlimab) hjelper til med å forebygge nedbrytningen av røde blodceller ved å påvirke komplementsystemet som er en del av ditt immunsystem. Komplementsystemet hjelper vanligvis til med å bekjempe infeksjoner i kroppen din. Alvorlige infeksjoner (lungebetennelse, blodforgiftning (sepsis)) og meningokokkinfeksjoner anses derfor som en del av risikoene ved behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab).

Vaksinering^{1, 2}

Før du får behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab) vil legen snakke med deg om viktigheten av vaksinering

- Snakk med lege for å få bekreftet at du er tilstrekkelig vaksinert i henhold til gjeldende lokale anbefalinger og at du også har tatt meningokokk- og pneumokokkvaksiner
- Det anbefales at du får vaksine mot meningokokker og pneumokokker minst 2 uker før du får din første dose med **ENJAYMO** (sutimlimab), dersom du ikke er vaksinert tidligere
- Selv om du tidligere har blitt vaksinert, bør du revaksineres. Legen vil gi deg råd om du behøver ytterligere vaksinering mot meningokokker og pneumokokker
- Dersom legen anser det nødvendig med akutt behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab), skal du vaksineres så snart som mulig etter første behandling
- Vaksinasjon mot visse bakterielle infeksjoner kan hjelpe med å redusere risikoen for å få disse infeksjonene, men forhindrer ikke alltid at du får dem.



Tegn og symptomer på infeksjoner du må være oppmerksom på^{1, 2}

Si ifra til legen dersom du har en form for infeksjon, inkludert pågående infeksjon som hiv, hepatitt B eller hepatitt C. Si ifra til lege straks dersom du mistenker at du kan ha en infeksjon eller utvikler noen av de følgende symptomer som kan være tegn på en infeksjon under behandling med **ENJAYMO** (sutimlimab):

- Feber med eller uten utslett
- Frysninger
- Influensalignende symptomer
- Hoste/pustevansker
- Hodepine med kvalme, brekninger, nakkestivhet, stiv rygg
- Forvirring
- Lysømfintlighet
- Smerte når du tisser eller du tisser oftere enn vanlig

Ytterligere informasjon

For mer informasjon om ENJAYMO (sutimlimab), vennligst kontakt Recordati AB på telefon +46 (0)8 545 802 30 eller via e-post: **rrdnordicsinfo@recordati.com**

Bivirkninger kan meldes på elektronisk skjema til DMP: www.dmp.no/pasientmelding. Se oppdatert pakningsvedlegg, preparatomtale (SmPC) og opplæringsmateriell på www.felleskatalogen.no.

Referanser

1. ENJAYMO preparatomtale
2. ENJAYMO pakningsvedlegg

RECORDATI AB

Berzelius väg 8
171 65 Solna, Sweden
Tel. +46 (0)8 545 802 30
www.recordati.com



ENJAYMO-NO-0001-08APR2025