

환자 가이드



중요 안전성 정보

이 가이드는 다음에 대한 정보를 제공합니다.

- 엔제이모주(수팀리맵)란?
- 중대한 감염의 위험
- 수막구균 감염의 위험
- 예방접종 권고사항
- 엔제이모주(수팀리맵) 치료 중 알아야 할 감염 증상

엔제이모주(수팀리맵)에 대해 알아야 할 사항



엔제이모주(수팀리맵)란 무엇입니까?

엔제이모주(수팀리맵)는 한랭응집소병(CAD)이 있는 성인 환자의 적혈구 파괴 치료에 사용되는 처방약입니다. 빈혈을 줄이고 피로를 줄여줍니다.



한랭응집소병이란 무엇입니까?

한랭응집소병은 면역(방어) 체계의 특정 항체가 적혈구에 결합하는 희귀 혈액 질환입니다. 이로 인해 적혈구가 파괴됩니다. (용혈성 빈혈)

엔제이모주(수팀리맵) 치료 시 감염 위험



엔제이모주(수팀리맵)는 보체 경로로 알려진 면역 체계의 일부를 표적으로 하여 적혈구 파괴를 예방하는 데 도움을 줍니다. 이 경로는 일반적으로 체내 감염을 제거하는데 도움이 됩니다. 따라서, 중대한 감염(폐렴, 패혈증) 및 수막구균 감염은 엔제이모주 (수팀리맵) 투여의 위험 중 하나로 간주됩니다.

예방접종

엔제이모주(수팀리맵)로 치료 받기 전에 담당 의사는 예방접종의 중요성에 대해 상의할 것입니다.



- 최신의 가이드라인에 따라 적절히 예방접종을 받았으며 수막구균 및 폐렴구균 백신도 접종받았는지 담당 의사와 확인하십시오.
- 이전에 예방접종을 받은 적이 없는 경우, 엔제이모주(수팀리맵) 첫 투여 최소 2 주 전에 수막구균 및 폐렴구균 백신을 접종하는 것이 권고됩니다.
- 과거에 백신 접종을 받았더라도 백신 부스터 접종을 받아야 합니다. 담당 의사는 추가 수막구균 및 연쇄구균 백신 접종이 필요한지 여부에 대해 알려드릴 것입니다.
- 담당 의사가 엔제이모주(수팀리맵)를 사용한 긴급 치료가 필요하다고 결정하는 경우, 치료를 받은 후 가능한 한 빨리 백신 접종을 받아야 합니다.
- 특정 세균 감염에 대한 백신 접종은 이러한 감염에 걸릴 위험을 낮추는 데 도움이 될 수 있지만, 이를 예방하지는 못할 수 있습니다.

알아야 할 감염 증상 및 징후

감염이 있는 경우 담당 의사에게 알려주세요.

엔제이모주(수팀리맵)로 치료 중 감염이 의심되거나 감염의 증상일 수 있는 다음과 같은 증상이 발생하는 경우 가능한 한 빨리 담당 의사에게 알려주세요.



- 발진을 동반하거나 동반하지 않은 발열
- 오한
- 독감 유사 증상
- 기침 / 호흡 곤란
- 구역질, 구토, 뱀뱃한 목 또는 등을 동반한 두통
- 혼돈
- 빛에 대한 눈의 민감성
- 배뇨 중 통증 또는 배뇨 빈도 증가

추가 정보

엔제이모주(수팀리맵)에 대한 자세한 정보는 <https://nedrug.mfds.go.kr> 의 허가사항을 참고하거나 레코르다티 코리아 [02-539-1170] 에 문의하세요.

참고문헌

1. 엔제이모주(수팀리맵) 제품설명서

