

دليل لمتلقي العلاج

معلومات سلامة هامّة

يوفر هذا الدليل معلومات حول:

- ماهو إنجايمو (سوتيمليراب)
- خطر الإصابة بحالات العدوى الخطيرة والالتهابات السحائية
- توصيات لأخذ التطعيمات
- علامات العدوى التي يجب الانتباه إليها أثناء العلاج باستخدام إنجايمو (سوتيمليراب)

ماذا عليك أن تعرف عن إنجايمو (سوتيمليراب)

ما هو إنجايمو (سوتيمليراب)^{1,2}؟

إنجايمو (سوتيمليراب) هو دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج انحلال خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم) لدى المرضى البالغين المصابين بمرض التراص البارد (CAD). يُخفف هذا الدواء من فقر الدم والتعب.



ما هو مرض التراص البارد CAD¹؟

CAD هو اضطراب دموي نادر، ترتبط فيه أجسام مضادة معينة من الجهاز المناعي (الدفاع) بخلايا الدم الحمراء، مما يؤدي إلى تحللها (انحلال الدم).



خطر الإصابة بالعدوى أثناء العلاج باستخدام إنجايمو (سوتيمليراب)¹

يساعد **إنجايمو** (سوتيمليراب) على منع تدمير خلايا الدم الحمراء من خلال استهداف جزء من جهاز المناعة يُسمى مسار المتممة (جزء من جهاز المناعة). يساعد هذا المسار عادةً على التخلص من العدوى في الجسم. لذلك، تُعدّ العدوى الخطيرة (الالتهاب الرئوي، تسمم الدم) والتهابات المكورات السحائية من بين المخاطر المرتبطة بالعلاج باستخدام **إنجايمو** (سوتيمليراب).

تلقي تطعيم^{2,1}



قبل تلقي العلاج باستخدام **إنجايمو** (سوتيمليراب) سيتحدث معك طبيبك حول أهمية التطعيمات.

- افحص مع طبيبك إذا كنت قد تلقيت التطعيمات اللازمة وفقاً لأحدث التوصيات في إسرائيل، ومن تلقى أيضاً تطعيمات ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية.
- إذا لم تكن قد تلقيت التطعيمات من قبل، يُنصح بتلقي التطعيم ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية قبل تلقي جرعتك الأولى من **إنجايمو** (سوتيمليراب) بأسبوعين على الأقل.
- حتى لو كنت قد تلقيت تطعيمات سابقة، يجب عليك تلقي جرعات معززة من التطعيمات. سيقدم لك طبيبك الاستشارة بشأن ما إذا كنت بحاجة إلى تطعيمات إضافية ضد المكورات السحائية والمكورات الرئوية.
- إذا قرر طبيبك أنك بحاجة إلى علاج عاجل باستخدام **إنجايمو** (سوتيمليراب)، فيجب عليك تلقي التطعيمات في أسرع وقت ممكن بعد تلقي العلاج.
- قد يساعد التطعيم ضد بعض أنواع العدوى البكتيرية في تقليل خطر الإصابة بها، ولكنه قد لا يمنعها.

أعراض وعلامات العدوى التي يجب الانتباه إليها^{1,2}



أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من أي عدوى، بما في ذلك عدوى مستمرة مثل فيروس نقص المناعة البشرية – HIV، التهاب الكبد B أو التهاب الكبد C. أثناء العلاج بدواء **إنجايمو** (سوتيمليراب)، أخبر طبيبك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تشك في إصابتك بعدوى أو إذا ظهر عليك أي من الأعراض التالية التي قد تكون علامات على وجود عدوى:

- حمى مع أو بدون طفح جلدي
- قشعريرة
- أعراض شبيهة بالإنفلونزا
- سعال/صعوبات في التنفس
- صداع مع غثيان، قيء، تصلب في الرقبة، وتصلب في الظهر
- ارتباك
- حساسية العين للضوء
- ألم عند التبول أو وتيرة تبول عالية

المراجع

1. نشرة **إنجايمو** (سوتيمليراب) للطبيب
2. نشرة **إنجايمو** (سوتيمليراب) للمستهلك

تمت المصادقة على هذا الدليل وفقاً لتعليمات وزارة الصحة في يونيو/حزيران 2025
يمكن الإبلاغ عن الأعراض الجانبية لوزارة الصحة من خلال الرابط التالي: <https://sideeffects.health.gov.il>
للتبليغ المباشر لماديسون فارما عبر البريد الإلكتروني PVIsrael@medisonpharma.com