



מדריך למטופל

מידע בטיחותי חשוב

מדריך זה מספק מידע על:

- מהו **אנג'יימו** (סוטימלימאב)
- הסיכון לזיהומים חמורים ולזיהומים מנינגוקוקים
- המלצות לחיסונים
- תסמיני זיהומים שיש להיות מודעים אליהם בזמן הטיפול
- ב- **אנג'יימו** (סוטימלימאב)

מה עליך לדעת על אנג'יימו (סוטימלימאב)

מהו אנג'יימו (סוטימלימאב)?^{1,2}

אנג'יימו (סוטימלימאב) היא תרופת מרשם המשמשת לטיפול בפירוק תאי דם אדומים (המוליזה) במטופלים מבוגרים עם מחלת אגלוטינין קרה (CAD). היא מפחיתה אנמיה ועייפות.



מה זה CAD?¹

CAD היא הפרעת דם נדירה שבה נוגדנים מסוימים של מערכת החיסון (ההגנה) נקשרים לתאי דם אדומים. הדבר גורם לפירוק תאי הדם האדומים (המוליזה).



הסיכון לזיהום בטיפול עם אנג'יימו (סוטימלימאב)^{1,2}:

אנג'יימו (סוטימלימאב) מסייע במניעת הרס של תאי דם אדומים באמצעות מיקוד בחלק ממערכת החיסון שלך המכונה המסלול המשלים (חלק ממערכת ההגנה החיסונית). מסלול זה בדרך כלל עוזר בסילוק זיהומים מגופך. לכן, זיהומים חמורים (דלקת ריאות, אלח דם) וזיהומים מניגוקקליים הינם בין הסיכונים הכרוכים בטיפול עם **אנג'יימו** (סוטימלימאב).

קבלת חיסון^{2,1}



לפני קבלת הטיפול ב- **אנג'יימו** (סוטימלימאב), הרופא שלך ישוחח איתך על חשיבות החיסונים.

- בדוק עם הרופא שלך שאתה מחוסן כראוי על פי ההמלצות העדכניות בישראל וגם שקיבלת חיסונים כנגד מנינגוקוק ופנוימוקוק
 - אם לא חוסנת בעבר, מומלץ להתחסן כנגד מנינגוקוק ופנוימוקוק לפחות שבועיים לפני קבלת המנה הראשונה של **אנג'יימו** (סוטימלימאב)
 - גם אם חוסנת בעבר, עליך לקבל מנות דחף של חיסונים. הרופא שלך ייעץ לך אם אתה צריך חיסונים נוספים כנגד מנינגוקוק ופנוימוקוק
 - במידה והרופא שלך יחליט שיש צורך בטיפול דחוף ב- **אנג'יימו** (סוטימלימאב), עליך לקבל חיסון בהקדם האפשרי לאחר קבלת הטיפול
 - קבלת חיסון נגד זיהומים חיידקיים מסוימים יכולה לעזור להפחית את הסיכון שלך לקבלת זיהומים אלה, אך ייתכן שלא תמנע אותם
-

תסמינים וסימנים של זיהומים שיש להיות מודעים אליהם^{1,2}



יש להודיע לרופא שלך אם יש לך זיהום כלשהו, כולל זיהום מתמשך כגון HIV, הפטיטיס B או הפטיטיס C. במהלך הטיפול ב- **אנג'יימו** (סוטימלימאב), ספר לרופא שלך בהקדם האפשרי אם אתה חושד שיייתכן שיש לך זיהום או שאתה מפתח אחד מהתסמינים הבאים שעלולים להיות תסמיני זיהום:

- חום עם או ללא פריחה
- צמרמורות
- תסמינים דמויי שפעת
- שיעול/קשיי נשימה
- כאב ראש עם בחילות, הקאות, צוואר נוקשה, גב נוקשה
- בלבול
- רגישות העין לאור
- כאב בעת מתן שתן או מתן שתן בתדירות גבוהה יותר

סימוכין

1. עלון לרופא של **אנג'יימו** (סוטימלימאב)
2. עלון לצרכן של **אנג'יימו** (סוטימלימאב)

מדריך זה אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות ביוני 2025

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הקישור הבא: <https://sideeffects.health.gov.il>
כמו כן ניתן לדווח ישירות למדיסון פארמה במייל PVIsrael@medisonpharma.com